

Analisi I - IngBM - 2018-19
COMPITO A 13 Gennaio 2018

COGNOME NOME

MATRICOLA VALUTAZIONE + =

1. ISTRUZIONI

Gli esercizi devono essere svolti negli appositi spazi del presente fascicolo; solo questo sarà ritirato e valutato. I fogli a quadretti messi a disposizione possono essere usati liberamente ma in nessun caso saranno ritirati. Il compito è composto di due parti. La prima parte deve essere svolta preliminarmente. Essa verrà corretta per prima e valutata con un punteggio di $0 \leq x \leq 10$ punti. Condizione necessaria affinché venga preso in considerazione l'eventuale svolgimento della seconda parte è che $x \geq 6$. In tal caso la seconda parte viene valutata con un punteggio di $0 \leq y \leq 24$ punti. Il compito sarà sufficiente per l'ammissione alla prova orale se $x + y \geq 18$. In tal caso il voto di ammissione all'orale sarà $v = \min(28, x + y)$.

2. PRIMA PARTE

Esercizio 0. (0 punti) Leggere e capire le istruzioni.

Esercizio 1. (3 punti) Studiare il comportamento (convergente, divergente o irregolare) della serie:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2 + \log(n)}.$$

SOLUZIONE

La serie è

CONVERGENTE

DIVERGENTE

IRREGOLARE

perché

Esercizio 2. (4 punti) Determinare i punti di massimo e minimo assoluto della funzione $f : [-2, 2] \rightarrow \mathbf{R}$ definita da $f(x) = |x^3 - x|$.

SOLUZIONE.

I punti di massimo assoluto sono

I punti di minimo assoluto sono

perché

Esercizio 3. (3 punti) Siano A , B e C insiemi finiti tali che $|A| = 2$, $|B| = 4$, $|C| = 2$ e $C \subset B$. Determinare il numero delle applicazioni iniettive $f : A \rightarrow B$ tali che $f(A) \cap C \neq \emptyset$.

SOLUZIONE.

3. SECONDA PARTE

Esercizio 1. (6 punti) Si consideri la funzione $f : \mathbf{R} \rightarrow \mathbf{R}$ definita da:

$$f(x) = \begin{cases} x^3 - x & \text{se } x \geq 0 \\ x - x^3 & \text{se } x < 0 \end{cases}$$

- (1) Determinare il più grande sottoinsieme C di \mathbf{R} tale che la restrizione di f su C sia continua.
- (2) Determinare il più grande sottoinsieme aperto D di \mathbf{R} tale che la restrizione di f su D sia derivabile.
- (3) Determinare i punti di massimo o minimo, locali o assoluti di f .
- (4) Determinare gli eventuali asintoti di f .

SOLUZIONE.

$C =$

$D =$

Massimi locali

Massimi assoluti

Minimi locali

Minimi assoluti

Asintoti

Esercizio 2. (4 punti)

Si consideri il sottoinsieme X di \mathbf{R} formato dagli $x \in \mathbf{R}$ tali che esiste $t \in \mathbf{R}$ per cui $|t - 1|x = t$.

- (a) Determinare se X è un intervallo.
- (b) Determinare gli eventuali estremo inferiore o superiore di X .

SOLUZIONE

Esercizio 3. (4 punti) (4 punti) Siano $f_+, f_- : \mathbf{R} \rightarrow \mathbf{R}$ funzioni continue tali che

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} f_{\pm} = \pm\infty, \quad \lim_{n \rightarrow -\infty} f_{\pm} = \mp\infty.$$

Dimostrare che esiste $x_0 \in \mathbf{R}$ tale che $f_+(x_0) = f_-(x_0)$.

SOLUZIONE

Esercizio 4. (4 punti) Si determini $X = \{z \in \mathbf{C} \setminus \{i\} : (\frac{z+i}{z-i})^3 = 1\}$.

SOLUZIONE

Esercizio 5. (6 punti) Si determini, se esiste, la soluzione massimale dell'equazione differenziale

$$y' = \frac{t}{2y}$$

tale che $y(1) = 1$.

SOLUZIONE